

DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: WWW.ZEBRATATTOOSUPPLY.COM



USO TÓPICO

INGREDIENTES

Para formula al 40%

Lidocaína 5%, Prilocaina 5%, Epinefrina 1% y base de crema.

Para formula al 55%

Lidocaína 8%, Prilocaina 8%, Epinefrina 2% y base de crema.

La dosificación es como lo indique su médico.

Usos:

Micro-pigmentación, tatuajes, IPL, BB GLOW, Body piercing, Remoción de tatuajes laser, remoción de berugas y depilaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Quite la tapa y perforo el sello con el frente de la misma. Tape después de usar para mantener funcional la anestesia.

1. Lave la zona a tratar con agua y jabón, después secar la zona por completo.
2. Aplique una cantidad espesa de TKTX (1/8 "o 2-3 mm de grosor) en el área y distribuya uniformemente.
3. Cubra el área con una envoltura de plástico. El calor debajo de la envoltura de plástico ayuda a activar la crema y evita que la crema se seque.
4. Deje reposar de 25-50min. antes de comenzar el proceso. Para sesiones largas que implican vareas áreas, se recomienda retirar el plástico en secciones a medida que avanza el procedimiento.
5. La piel generalmente permanece adormecida durante 2 a 3 horas, una vez que se retira la crema de la piel adormecida según el tipo de piel y la ubicación del cuerpo.

Si sus efectos secundarios le molestan, o si experimenta efectos inusuales mientras está usando el producto, suspenda su uso y comuníquese con su proveedor médico de inmediato.

Reacciones adversas:

Es probable que sus posibles efectos secundarios incluyan hinchazón o enrojecimiento en el sitio de la aplicación, sensaciones inusuales en la piel o piel pálida. Los efectos secundarios de severos a raros pueden incluir reacciones alérgicas como urticaria, erupción cutánea, picazón, hinchazón facial y dificultad para respirar u opresión en el pecho.

Farmacocinética:

La lidocaína se puede absorber después de la administración tópica a las membranas mucosas, su velocidad y grado de absorción dependen del sitio específico de aplicación, la duración o exposición, la concentración y la dosis total.

Advertencia:

*No debe utilizarse en niños menores de 6 años.

*No usar si es alérgico(a) a la lidocaína u otros anestésicos locales.

*NO debes aplicar la crema en cortes, rasguños, heridas; áreas donde hay una erupción cutánea o eczema, En o cerca de los ojos, oídos, boca, (dentro) nariz o ano (parte posterior) o los genitales de los niños.

*Adultos y niños de 6 años de edad y mayores: Aplique a las áreas afectadas no más de 2 veces al día.

PRECAUCIONES

*ALMACENAR POR ENCIMA DE CERO Y POR DEBAJO DE 30 C. * PROTEGER DE LA LUZ SOLAR. * NO CONGELAR.

* MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

A TOMAR EN CUENTA.

LA DURACIÓN DEL EFECTO PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE PIEL, LUGAR DE USO Y TIPO DE TRATAMIENTO. LOS COLORES SÓLO SON REFRENTES PARA QUE SEPA CUÁL ES EL QUE SUERTE MAYOR O MEJOR EFECTO EN SU PIEL. RECUERDE QUE ESTAS SON RECOMENDACIONES DE USO, PERO PUEDEN VARIAR SEGÚN EL PERSONAL PROFESIONAL Y EL TRATAMIENTO AL QUE SE SOMETA.